

OMtp2

Date: 27
Personne: 2014
Personne: 37
Personne: 37
Personne: 37
Personne: 37
Personne: 37
Nb feuille: 5







dintindantindantindantind

NOM Abdukiaki

Inntmilimin

EMPLACEMENT 8 R5 1 196.200

ani:

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Ferti- lité		raison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	Maturité
2 3 4 5	full 4	28.3	1.4	0					\mathcal{Q}_{o}	
		Pourri	ture :	Port :/	ni orige	Vi	gueur	: 1,5 fe	iva	*
			1,4							

NOM Abdukiaki

EMPLACEMENT 8 RS, 136-200

Floraison début mi/f fin Véraison début mi/v fin Débourrement début mi/déb Ferti-Nbre Nbre Maturité lité Souche yeux grap 7 8.3 13.3.0 Vigueur : 2 Pourriture : Port: mi enge Mill. : D & 13.3.89 - 5

ANNEE 1990

NOM

Abdukiaki

EMPLACEMENT 8 R5 A 196. 200

doutedoutedoutedouted

i

Juntanlanta

						-	A L				
Souche	Nbre yeux	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v		Maturité
0X 2 } % . 5	4	26.2 Selv le	1,3 %	0 (-8)	C>						
Po	urritu	re:	Mi	ill. :		Port		Vi	gueur	:	

ANNEE 1991 NOM Abdukiaki

mi

EMPLACEMENT 8 Rg 5 1 196. 200

Souche Nhre Débourrement Nhre début mi/dés grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Cr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : enge · Viqueur : 2

AMMEE: 1996

WOM Abdukiaki

Ob. 228.79

Where Debourry

EMPLACEMENT. 8 R5 A136, 200

	uv	· 228.	+3						,			,
die			rranent mi/déb		Ferti-	Flor	mi/E	fin		mi/v	fin	Maturit.6
x 2. 3			15.2* 22.21- 96 (-23)	0	Four :	TC - C disc-sp g : B-C : s -	Mil; - 4 oh-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P - ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus fuc - erb		: 1 : C

N° d'ordre :

Désignation: Abdukiaki
Emplacement: 08 R5 s 186-200 (5.200)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - a plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198).

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dontodontodontodontod

Etallées - en gouttlière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202) - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 (à plages bronzées ou cuivrées 2/10 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 11 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 26 legt 4: duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 2(33).

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Abdukiaki 8 R 5 s. 196.200 (2.5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 25/4 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Abdukiakí 8 R5 s- 196-200 (s.5)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 462 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo88

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code cepage ~ Nom cépage : Ab-dukiaki

Code clone

Observateur

Emplacement: 8 Rs 196. 200

uluutuuluutuuluutuuluutuul

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 6 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre @ - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes D- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence P - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence D- présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds**: très courts (-60mm) \mathcal{O} - courts (90mm) \mathcal{I} - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) \$\mathcal{O}\$- grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Vig 3/5

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé / très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis I moyens (3 - saillants 3